



Human  
Services

# Vaccines / Immunizations / Shots

Telephone: 212-7000 10 Sunnybrook Road • P.O. Box 14049 • Raleigh, NC 27620-4049

## Children 0-6 Years

AGE	VACCINE / IMMUNIZATION / SHOT
At Birth	HBV (Hepatitis B Vaccine)
2 Months	HBV, DTaP (Diphtheria, Tetanus, and acellular Pertussis), IPV (Inactivated Polio Vaccine), Hib (Haemophilus B), Rotavirus* (Intestinal Virus), PCV (Pneumococcal Conjugate Vaccine)
4 Months	DTaP, IPV, Hib, Rotavirus*, PCV
6 Months	HBV, DTaP, IPV, Hib, Rotavirus*, PCV
Over 6 Months	Flu* (Influenza) After 2 doses the first year, 1 dose yearly.
12—18 Months	DTaP, Hib, MMR (Measles, Mumps, and Rubella), Var (Chickenpox), PCV, HAV* (Hepatitis A, 2 doses)
4-6 Years	DTaP, IPV, MMR, Var

## Adults and Children 7 Years and Over

VACCINE / IMMUNIZATION	WHO SHOULD RECEIVE:
HPV* (Human Papilloma Virus), 3 doses	People aged 9-26.
Tdap (Tetanus, diphtheria and acellular pertussis) or Td (Tetanus/diphtheria), 1 dose every 10 years	1 dose of Tdap is required for all rising 7th graders. 1 dose of Tdap is recommended for all pregnant women during each pregnancy.
Varicella (chickenpox), 2 doses	People who have never had chickenpox or who did not get 2 doses as a child.
Meningococcal (Meningitis), 1 or 2 doses	1 dose is required for all rising 7th graders. 1 dose is recommended at age 16. Recommended for unvaccinated students entering college, some international travelers, and people with certain medical conditions that put them at risk. Ask your doctor.
HAV (Hepatitis A), 2 doses	People who have not been vaccinated against hepatitis A and are at risk. Ask your doctor.
HBV (Hepatitis B), 3 doses	People who have not been vaccinated against hepatitis B and are at risk. Ask your doctor.
Twinrix (Hepatitis A & B), 3 doses	People who have not been vaccinated against hepatitis A or B and are at risk. Ask your doctor.
MMR (Measles, Mumps, Rubella), 2 doses	Adults who have never had these diseases or who did not get the recommended doses in childhood.
Flu* (Influenza), 1 dose yearly	Everyone over 6 months of age.
Zostavax (Shingles), 1 dose	Adults 50 years of age or older.
PPV and PCV13 (Pneumococcal disease), 1 dose of each vaccine	Adults 65 years of age or older and adults under 65 with long term health problems should get one dose of each vaccine.



Human  
Services    Teléfono: 212-7000

# Vacunas

10 Sunnybrook Road • P.O. Box 14049 • Raleigh, NC 27620-4049

## Niños de 0-6 Años

EDAD	VACUNA
Al Nacer	HBV (Hepatitis B)
2 Meses	HBV, DTaP (Difteria, Tétano, y Pertusis/Tos Ferina), IPV (Vacuna Inactiva contra el Polio), Hib (Hemófilo tipo B), Rotavirus* (Virus Intestinal), PCV (Neumocócica Conjugada)
4 Meses	DTaP, IPV, Hib, Rotavirus*, PCV
6 Meses	HBV, DTaP, IPV, Hib, Rotavirus*, PCV
Mayor de 6 Meses	Flu/Gripe* (Influenza) Después de 2 (dos) vacunas el primer año, 1 (una) vacuna cada año
12—18 Meses	DTaP, Hib, MMR (Sarampión, Paperas, y Rubéola), Var (Varicela), PCV, HAV*
(Hepatitis A, 2 vacunas)	
4-6 Años	DTaP, IPV, MMR, Var

## Adultos y Niños con 7 Años o Más

VACUNA	QUIENES DEBEN RECIBIR:
HPV* (Virus de Papiloma Humano), 3 vacunas	Jóvenes de 9 a 26 años de edad.
Tdap (Tétano, difteria y tos ferina) o Td (Tétano/difteria), 1 vacuna cada 10 años.	Se requiere una vacuna para todos los niños entrando al séptimo grado. Se recomienda una vacuna para todas las mujeres embarazadas, durante cada embarazo.
Varicela, 2 vacunas	Personas que nunca tuvieron la varicela o que no se vacunaron 2 (dos) veces como niños.
Meningococo* (Meningitis), 1 o 2 vacunas	Se requiere una vacuna para todos los niños entrando al séptimo grado. Se recomienda una vacuna a los 16 años de edad y para estudiantes entrando a la universidad, algunos viajeros internacionales, y personas con algunas condiciones medicas que las ponen en riesgo y que no han estado vacunados anteriormente. Pregunte a su doctor.
HAV (Hepatitis A), 2 vacunas	Personas que no han estado vacunadas contra la hepatitis A y que tienen riesgo de contraerla. Pregunte a su doctor.
HBV (Hepatitis B), 3 vacunas	Personas que no han estado vacunadas contra la hepatitis B y que tienen riesgo de contraerla. Pregunte a su doctor.
Twinrix (Hepatitis A y B), 3 vacunas	Personas que no han estado vacunadas contra la hepatitis A o B y que tienen riesgo de contraerlas. Pregunte a su doctor.
MMR (Sarampión, Paperas, Rubéola), 2 vacunas	Adultos que nunca tuvieron estas enfermedades o que no completaron la seria de vacunas recomendadas como niños.
Influenza*, 1 vacuna cada año	Todas las personas mayores de 6 meses de edad.
Zostavax (herpes zóster) 1 vacuna	Adultos, 50 años de edad o más.
PPV y PCV13 (neumocócica), 1 dosis de cada vacuna	Adultos, 65 años de edad o más y adultos menores de 65 con problemas de salud crónicos deben ponerse una dosis de cada vacuna.

\*Vacunas recomendadas para niños, pero que no están requeridas bajo la ley de Carolina del Norte.