Post-Surgical Care Instructions

Congratulations! Your new pet was recently spayed or neutered and has a fresh incision and green tattoo.

Take it easy for 10-14 days. Too much activity can cause painful bruising and swelling.


Stay on-leash when outside, no zoomies!



Take your meds. Most dogs will receive pain medication to give at home.

Don't worry, cats already got theirs injected, so you don't have to begin your bonding with a fight over medication.

Protect the incision. Failure to do so will result in infection (and treatment at your cost).



NO bathing or swimming. Waterless/no-rinse shampoo is OK.

NO licking or chewing the incision! **Be prepared!** →

Avoid other animals and places where animals congregate to reduce exposure to infection. Your pet's immune system is already working overtime!

Information on surgery recovery tools, food, and more!

The First Night

Your pet may act more sedate than usual and may be more hesitant to eat, or may over-indulge in food or water. To prevent regurgitation, break their dinner up into smaller portions and control water intake.
Consider giving a bit of canned food.
Make sure they have a quiet and calm space to rest in.

Normal

- Decreased appetite and activity.
- Mild cough for 2-3 days.
- Mild redness and bruising around the incision and tattoo.
- Mild reddish drainage from scrotal neuter incisions.

Not Normal (and not in a good way)

Seek veterinary assistance ASAP if you see any of these symptoms:

- Severe swelling or bruising.
- Opening of the incision.
- Bleeding.
- Licking or chewing of the incision.
- Inactivity or poor appetite for more than 2 days.
- Repeated vomiting.
- Painfulness at the incision site, sensitivity to touch, whimpering, reluctance to move.

Go ahead and schedule a wellness visit with your vet for 7-14 days after surgery.

revised January 2024

Instrucciones de Cuidados Postoperatorios

¡Felicidades! Su nueva mascota ha sido castrada recientemente y tiene una incisión fresca y un tatuaje verde.

Tómese las cosas con calma durante 10-14 días.

Demasiada actividad puede causar hematomas dolorosos e hinchazón.

No le quite la correa cuando salga, ¡nada de volverse locos!



Dele su medicamento.


La mayoría de los perros reciben analgésicos en casa.

No se preocupe, a los gatos ya les han inyectado el suyo, así que no tiene por qué empezar su vínculo afectivo con una pelea a causa del medicamento.

Proteja la herida.

No hacerlo provocará una infección (y un tratamiento que usted paga).

NO le de baños ni lo lleve a nadar. El champú sin agua/sin enjuague está permitido.



¡NADA de lamerse o morderse la incisión!

Evite otros animales y los lugares donde se reúnen los animales para reducir la exposición a la infección. ¡El sistema inmunológico de su mascota ya está trabajando horas extras!

¡Prepárese!

Información sobre herramientas para la recuperación de la cirugía, alimentos, ¡y mucho más!

La primera noche

Su mascota puede actuar más sedada de lo habitual y mostrarse más reacia a comer, o puede excederse con la comida o el agua. Para evitar la regurgitación, divida su cena en porciones más pequeñas y controle la ingesta de agua.
Considere la posibilidad de dar un poco de comida enlatada.
Asegúrese de que disponen de un espacio tranquilo y relajado en el que descansar.

Normal

- Disminución del apetito y la actividad.
- Enrojecimiento leve y hematomas alrededor de la incisión y el tatuaje.
- Tos leve durante 2-3 días.
- Secreción rojiza leve de las incisiones de castración escrotal.

No es normal (y no en el buen sentido)

Busque asistencia veterinaria lo antes posible si observa alguno de estos síntomas:

- Hinchazón o hematomas intensos.
- Apertura de las incisiones.
- Sangrado.
- Lamerse o masticar la incisión.
- Inactividad persistente y/o falta de apetito.
- Vómitos repetidos.
- Dolor en el lugar de la incisión, sensibilidad al tacto, gemidos, no querer moverse.

Prepárese y programe una visita de bienestar con su veterinario para 7-14 días después de la cirugía.

Editado en febrero de 2024.